

Vous allez avoir un

LAVEMENT AU PRODUIT DE CONTRASTE

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement.

Vous avez en effet la possibilité de l'accepter ou de le refuser.

Le lavement au produit de contraste permet de voir des lésions du côlon (gros intestin).

Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cet examen pour répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

Si vous êtes susceptible d'être enceinte

Signalez-le à la secrétaire, à la manipulatrice

POUR L'EXAMEN

En dehors de L'urgence, Le côlon doit être parfaitement propre pour permettre un examen précis.

Pour cela, vous devez prendre une purge avant l'examen. Veuillez suivre à la lettre les instructions qui vous seront données pour cette préparation. Malgré des consignes bien suivies, la préparation peut parfois s'avérer insuffisante et faire renoncer à La poursuite de l'examen.

APPORTEZ LE JOUR DE L'EXAMEN

- La demande de votre médecin (ordonnance, Lettre, ...),
- Vos résultats d'analyse de sang
- La liste écrite des médicaments que vous prenez
- Votre dossier radiologique (radiographies, échographies, scanners, IRM).

DEROULEMENT DE L'EXAMEN

L'examen se fait essentiellement en position couchée. Il consiste à prendre plusieurs radios après avoir rempli l'intestin avec un liquide opaque aux rayons X. Celui-ci est introduit à L'aide d'une canule, par l'anus. Pendant l'examen on pourra également insuffler de l'air pour déplisser les parois du côlon. La durée de l'examen est en moyenne de 20 à 30 minutes.

LES RISQUES

Tout acte médical sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité maximales comporte un risque de complication.

Cet examen utilise des rayons X. Aucun risque n'a pu être démontré dans ce domaine compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. Les complications du lavement au produit de contraste sont très rares: blessure de la paroi intestinale. Ces complications peuvent être graves et nécessiter une opération chirurgicale urgente. Si vous constatez de violentes douleurs au cours de l'examen, il faut le dire immédiatement au radiologue. De petites douleurs supportables sont habituelles. Des réactions de type allergique sont également possibles, mais elles restent exceptionnelles.

01/10/09