

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Le transit du grêle est une radiographie de l'intestin grêle qui sert à mettre en évidence des lésions de ce segment digestif. Elle est utile à votre médecin pour déterminer l'origine de vos symptômes ou pour contrôler une intervention chirurgicale. Cet examen est l'examen de référence pour explorer l'intestin grêle, car l'endoscopie digestive (fibroscopie gastrique ou coloscopie) ne permet pas d'explorer ce segment digestif.

Si vous êtes susceptible d'être enceinte ou si vous allaitez

Signaler le à la secrétaire, à la manipulatrice

APPORTEZ LE JOUR DE L'EXAMEN

- la demande de votre médecin (ordonnance, lettre, ...),
- la liste écrite des médicaments que vous prenez
- Votre dossier radiologique (radiographies, échographies, scanners, IRM)

POUR L'EXAMEN

Il faut être à jeun strictement (sans boire, ni manger, ni fumer) durant les six heures précédant l'examen. Malgré cette précaution, il peut arriver que l'estomac soit encore plein et le radiologue pourra alors décider d'annuler l'examen.

LE DEROULEMENT DE L'EXAMEN

Un produit opaque aux rayons X sera administré par la bouche (sulfate de baryum ou produit de contraste hydrosoluble). Il arrive parfois que l'on mette une sonde dans l'estomac par le nez. Ces agents de contraste permettent de repérer le tube digestif supérieur lors des radiographies par rayons X.

Pendant l'examen, vous serez couché dans différentes positions. La durée de l'examen dépend de la progression du produit de contraste dans l'intestin et peut varier de 30 minutes à 1 h 30 voire 3 heures. Si vous constatez des douleurs au cours de l'examen, dites-le au radiologue.

LES RISQUES

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication.

Les complications du transit du grêle sont exceptionnelles :

- réaction allergique au produit de contraste absorbé,
- fausses routes, c'est-à-dire passage du produit de contraste dans les voies aériennes supérieures, ce qui peut être responsable de symptômes respiratoires,
- passage du produit de contraste à travers la paroi du tube digestif en cas de perforation.

Dans des cas très exceptionnels, ces complications peuvent être sérieuses.

APRES L'EXAMEN

Vous pourrez vous nourrir normalement

RESULTATS

Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l'examen. Il ne s'agira là que d'une première approche, car les images doivent être ensuite analysées par le médecin radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais.



IMAGERIE MÉDICALE DU BASSIN LORIENTAIS

<http://www.radiologie-orient.com>

56270 PLOEMEUR
CLINIQUE DU TER
5 allée de la clinique du Ter
02 97 37 87 45

56270 PLOEMEUR
26 rue Saint Bieuzy
02 97 86 34 60

56100 LORIENT
76 Av. du Général de Gaulle
02 97 64 35 04

56600 LANESTER
CENTRE ALPHA
44 Av. François Billoux
02 97 76 53 23

56700 HENNEBONT
11 Av. Salvador Allende
02 97 36 25 11

29300 QUIMPERLÉ
1 Avenue du Lézardeau
02 98 39 31 49